

РАННИЕ ПОЛОВЫЕ СВЯЗИ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ



В последнее время увеличилось число подростков, вступающих в ранние половые связи. В настоящее время молодые люди все больше вступают в половые отношения в подростковом возрасте, но мало кто из юношей и девушек задумывается обо всех последствиях ранней половой жизни.

Психологи отмечают, что у современных подростков значительно повысился интерес к проблемам секса. Подростки по телевизору или в видеофильмах видят много сцен, которые несут тот или иной сексуальный смысл.

Исследования показывают, что число юношей, начинающих половую жизнь до 16 лет, в настоящее время заметно выше, чем в том же возрасте у девушек.

Отмечается, что количество вступивших в половые связи школьниц за последние пять лет увеличилось вдвое по сравнению с предыдущим периодом.

Среди лиц, не достигших совершеннолетия, от 40% до 60% живут половой жизнью.

Установлено, что среди учащихся системы профтехобразования доля начавших половую жизнь до 16 лет значительно выше, чем среди учащихся общеобразовательных школ.

Половая зрелость

В юности просто необходим эмоциональный контакт полов, необходимо ощущение душевной близости и это влечёт за собой дружбу юношей и девушек. Юноши и девушки в юношеском возрасте интенсивно развиваются и физически, и психически.

Как уже известно, половая зрелость человека наступает гораздо раньше его социальной, гражданской зрелости - времени, когда молодые люди должны создавать свою семью.

Физическое развитие юношей завершается к 20 - 22 годам, а девушек - к 20. Зачем стремиться к половой жизни, рождению ребенка, если даже физическое развитие своего собственного организма еще не закончено?

Причины вступления в ранние половые отношения

Вступление в половые отношения в подростковом возрасте, как правило, происходит по следующим обстоятельствам:

- скука;
- алкогольное опьянение;
- желание привлечь к себе внимание и удержать партнера;
- для самоутверждения;
- как средство доказать свою взрослость;
- материальная выгода;
- насилие.

Последствия ранней половой связи

Ранняя половая жизнь подростков отрицательно влияет на молодой, ещё неокрепший организм. Всё, что совершается поспешно и необдуманно может принести вред человеку и лишние переживания, в том числе и ранние сексуальные отношения, но вряд ли они приведут к созданию счастливой семьи.

Увлечение половыми связями тормозит стремление к самосовершенствованию, преждевременно останавливает интеллектуальное развитие.

Раннее начало половой жизни зачастую ощутимо вредит здоровью, сдерживает физическое развитие.

Ранняя половая жизнь опасна тем, что приводит к нарушению гормональной регуляции репродуктивной системы, которая в этом возрасте только налаживается.

В результате раннего полового контакта девушке может угрожать нежеланная беременность, в то время как она: ни физически, ни психологически, ни социально еще не готова к материнству. Ранняя беременность, чаще всего заканчивается абортom со всеми его негативными последствиями: гинекологические заболевания как следствие аборта, беременности и родов в подростковом возрасте;

Трудноразрешимые социальные и морально-этические проблемы, связанные с ранним материнством.

Парадокс подросткового и юношеского возраста состоит в том, что при готовности к половой жизни организм практически не готов к родам. А первый аборт в юном возрасте может навсегда лишить женщину в будущем радости материнства.

Воспалительные процессы половых органов.

Хронический воспалительный процесс половых органов, возникший в результате ранней половой жизни, нередко приводит к бесплодию.

Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП) - это группа инфекционных заболеваний, возбудители которых передаются преимущественно половым путем. К инфекциям, передающимся половым путем, относятся 22 заболевания. Их условно разделяют на две группы:

- классические венерические болезни;

- другие инфекции, передающиеся половым путем.

Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП): гепатит, вирус папилломы человека, хламидиоз, кандидоз, трихомониаз, ВИЧ – инфекция, гонорея, герпес, сифилис, цитомегаловирусная инфекция и др.

Заражение происходит при тесном контакте с больным. Наиболее частый путь заражения – половой контакт, но возможен и бытовой, когда заражение происходит при поцелуе, пользовании предметами домашнего обихода, курении одной сигареты с больным.

Основные причины, способствующие заражению инфекциями половая распущенность и вседозволенность, вступление в интимные связи со случайными незнакомыми людьми.

Общие признаки ИППП внешне не заметны.

ИППП имеют общие признаки:

- имеют скрытый период: от момента проникновения в организм до появления каких-либо признаков заболевания может пройти от 3 дней до 6 месяцев, иногда даже до нескольких лет.
- часто протекают бессимптомно (без каких-либо проявлений) и случайно выявляются при обследовании.
- самопроизвольно не излечиваются.
- повреждают различные органы и ткани организма (мочеполовую систему, нервную систему, печень, сердце, кожные покровы), впоследствии приводят к большому количеству осложнений (бесплодие, импотенция, параличи, рак, поражение кожи и суставов, потеря зрения и прочее), которые крайне трудно лечить.
- часто встречается сочетание нескольких ИППП у одного человека.

Основные признаки ИППП:

- выделения (слизь, гной) из мочеиспускательного канала у мальчиков, из половых путей у девочек;
- боль при мочеиспускании, боль во время половых контактов, боль внизу живота;
- зуд (жжение) в области половых органов;
- сыпь на половых органах или рядом с ними, другие непонятные образования на коже;
- увеличение лимфатических узлов, чаще – в паховых областях.

Что делать, если такие симптомы появились или возникло опасение по поводу ИППП?

- не пугайтесь, практически все ИППП излечимы при своевременном (раннем) обращении.

- не раздумывайте, обращайтесь к врачу-дерматовенерологу в медицинскую организацию, имеющую право (государственную лицензию) на лечение таких заболеваний.
- при подтверждении заболевания обязательно пройдите курс лечения вместе с Вашим половым партнером у врача-дерматовенеролога.

НЕ ДОПУСКАЙТЕ САМОЛЕЧЕНИЯ ИЛИ ЛЕЧЕНИЯ ПО СОВЕТУ ЛИЦ, НЕ ИМЕЮЩИХ НА ЭТО ПРАВО!

Осложнения ИППП

Если ИППП не лечить или заниматься самолечением, то они могут вызывать тяжелые осложнения:

- бесплодие;
- импотенция;
- параличи;
- рак;
- поражение кожи и суставов;
- потеря зрения и прочее.

Последствия ранней половой связи - психологические расстройства.

Преждевременная половая жизнь оказывает опустошающее воздействие на эмоционально-психическую сферу и вредит здоровью.

Ранняя половая жизнь может быть причиной психологических травм, бесплодия в будущей семье, а также к сексуальной дисгармонии.

«Чем младше подросток в момент своей первой половой связи, тем меньше эта связь мотивируется любовью, тем больше в ней случайного, ситуативного».

Круглосуточный телефон доверия: 61-60-60

Детская телефонная линия: 8 (801)100 -16-11

8 (801)100 -21-21

Руководитель ЦЗМ «Феникс»

Е.В. Воронькова